


Linguaggi di Programmazione



Roberta Gori

Semantica Denotazionale HOFL-cap 9

Domini di interpretazioni

L'idea

Per ogni tipo introduciamo il corrispondente dominio $(V_\tau)_\perp$ definito induttivamente sulla struttura di τ in modo da poter assegnare un elemento del dominio $(V_\tau)_\perp$ ad ogni termine t chiuso e tipabile con tipo τ

Domini di interpretazioni

$$D_{int} \triangleq \mathbb{Z}_\perp$$

$$D_{\tau_1 * \tau_2} \triangleq (D_{\tau_1} \times D_{\tau_2})_\perp$$

distinguere:

coppia di termini divergenti
da coppia divergente

$$D_{\tau_1 \rightarrow \tau_2} \triangleq [D_{\tau_1} \rightarrow D_{\tau_2}]_\perp$$

distinguere:

prende arg e diverge
dalla divergenza senza prendere arg

Esempio

$$D_{int*int} \triangleq (\mathbb{Z}_\perp \times \mathbb{Z}_\perp)_\perp$$

$$\begin{array}{ll} \mathbf{rec}\ p.\ p & (\mathbf{rec}\ x.\ x, \mathbf{rec}\ y.\ y) \\ \perp_{D_{int*int}} & (\perp_{D_{int}}, \perp_{D_{int}}) \end{array}$$

Esempio

$$D_{int \rightarrow int} \triangleq [\mathbb{Z}_\perp \rightarrow \mathbb{Z}_\perp]_\perp$$

$$\begin{array}{ll} \mathbf{rec}\ f.\ f & \lambda x.\ \mathbf{rec}\ y.\ y \\ \perp_{D_{int \rightarrow int}} & \lambda d.\ \perp_{D_{int}} \end{array}$$

Domini di interpretazioni

$$D_{int} \triangleq \mathbb{Z}_\perp$$

$$D_{\tau_1 * \tau_2} \triangleq (D_{\tau_1} \times D_{\tau_2})_\perp$$

$$D_{\tau_1 \rightarrow \tau_2} \triangleq [D_{\tau_1} \rightarrow D_{\tau_2}]_\perp$$

Domini di interpretazioni

$$t : \tau \quad \llbracket t \rrbracket \rho \in D_\tau$$

/

ambiente

$$\rho : Var \rightarrow \bigcup_{\tau \in \mathcal{T}} D_\tau$$

tipo coerente con
assegnazione di
valori alle variabili

$$x : \tau \Rightarrow \rho(x) \in D_\tau$$

definiamo la funzione di interpretazione per ricorsione
strutturale

Semantica Denotazionale

Constanti

$$t : \tau \quad \llbracket t \rrbracket \rho \in D_\tau$$

$$\rho : Var \rightarrow \bigcup_{\tau \in \mathcal{T}} D_\tau$$

$$x : \tau \Rightarrow \rho(x) \in D_\tau$$

$$\begin{array}{c} \llbracket n \rrbracket \rho \triangleq \llbracket n \rrbracket \\ \dfrac{}{\dfrac{int}{D_{int} = \mathbb{Z}_\perp}} \qquad \dfrac{\mathbb{Z}}{\mathbb{Z}_\perp} \end{array}$$

Variabili

$$t : \tau \quad \llbracket t \rrbracket \rho \in D_\tau$$

$$\rho : Var \rightarrow \bigcup_{\tau \in \mathcal{T}} D_\tau$$

$$x : \tau \Rightarrow \rho(x) \in D_\tau$$

$$\llbracket x \rrbracket \rho \triangleq \underbrace{\rho(x)}_{D_\tau}$$

Operazioni aritmetiche

da dimostrare: $\underline{\text{op}}_\perp$ e' monotona e continua

$$\begin{array}{c} \text{op} \in \{+, -, \times\} \\ \llbracket t_1 \text{ op } t_2 \rrbracket \rho \triangleq \llbracket t_1 \rrbracket \rho \underline{\text{op}}_\perp \llbracket t_2 \rrbracket \rho \\ \begin{array}{c} \underbrace{\quad \quad}_{\text{int}} \quad \underbrace{\quad \quad}_{\text{int}} \\ \underbrace{\quad \quad}_{\text{int}} \\ \underbrace{\quad \quad}_{D_{\text{int}} = \mathbb{Z}_\perp} \end{array} \quad \begin{array}{c} \underbrace{\quad \quad}_{\text{int}} \quad \underbrace{\quad \quad}_{\text{int}} \\ \underbrace{\quad \quad}_{D_{\text{int}} = \mathbb{Z}_\perp} \quad \underbrace{\quad \quad}_{D_{\text{int}} = \mathbb{Z}_\perp} \\ \underbrace{\quad \quad}_{D_{\text{int}} = \mathbb{Z}_\perp} \end{array} \end{array}$$

$$\underline{\text{op}}_\perp : \mathbb{Z}_\perp \times \mathbb{Z}_\perp \rightarrow \mathbb{Z}_\perp$$

$$v_1 \underline{\text{op}}_\perp v_2 \triangleq \begin{cases} \lfloor n_1 \underline{\text{op}} n_2 \rfloor & \text{se } v_1 = \lfloor n_1 \rfloor \text{ e } v_2 = \lfloor n_2 \rfloor \\ \perp_{\mathbb{Z}_\perp} & \text{altrimenti } (v_1 = \perp_{\mathbb{Z}_\perp} \text{ o } v_2 = \perp_{\mathbb{Z}_\perp}) \end{cases}$$

chiamata estensione strict

Condizionale

da dimostrare: Cond_τ is monotona e continua

$$\llbracket \text{if } t \text{ then } t_1 \text{ else } t_2 \rrbracket \rho \triangleq \text{Cond}_\tau(\llbracket t \rrbracket \rho , \llbracket t_1 \rrbracket \rho , \llbracket t_2 \rrbracket \rho)$$

$\int \quad \tau \quad \tau$
 τ
 D_τ

$\int \quad \tau \quad \tau$
 $D_{int} = \mathbb{Z}_\perp \quad D_\tau \quad D_\tau$
 D_τ

$$\text{Cond}_\tau : \mathbb{Z}_\perp \times D_\tau \times D_\tau \rightarrow D_\tau$$

$$\text{Cond}_\tau(v, d_1, d_2) \triangleq \begin{cases} \perp_{D_\tau} & \text{se } v = \perp_{\mathbb{Z}_\perp} \\ d_1 & \text{se } v = \lfloor 0 \rfloor \\ d_2 & \text{altrimenti } (v = \lfloor n \rfloor \text{ con } n \neq 0) \end{cases}$$

Coppie

$$D_{\tau_1 * \tau_2} \triangleq (D_{\tau_1} \times D_{\tau_2})_{\perp}$$

$$\llbracket (t_1 , t_2) \rrbracket \rho \triangleq \lfloor (\llbracket t_1 \rrbracket \rho , \llbracket t_2 \rrbracket \rho) \rfloor$$
$$D_{\tau_1 * \tau_2} = (D_{\tau_1} \times D_{\tau_2})_{\perp}$$

The diagram illustrates the construction of the domain $D_{\tau_1 * \tau_2}$. It shows two components: $\llbracket t_1 \rrbracket \rho$ and $\llbracket t_2 \rrbracket \rho$, each represented by a bracketed expression. These components are then enclosed in a larger bracket, representing their product. Below this, the resulting domain $D_{\tau_1 * \tau_2}$ is shown as a bracketed expression, where the inner components are labeled D_{τ_1} and D_{τ_2} , separated by a cross symbol (\times).

Proiezioni

Equivalentemente: $\llbracket \mathbf{fst}(t) \rrbracket \rho \triangleq \text{let } d \Leftarrow \llbracket t \rrbracket \rho. \pi_1(d)$

$$\llbracket \mathbf{fst}(t) \rrbracket \rho \triangleq \pi_1^*(\llbracket t \rrbracket \rho)$$
$$\frac{\tau_1 * \tau_2}{\tau_1} \quad D_{\tau_1} \times D_{\tau_2} \rightarrow D_{\tau_1}$$
$$\frac{\tau_1 * \tau_2}{D_{\tau_1} = (D_{\tau_1} \times D_{\tau_2})^\perp}$$
$$\frac{(D_{\tau_1} \times D_{\tau_2})^\perp \rightarrow D_{\tau_1}}{D_{\tau_1}}$$

$$\llbracket \mathbf{snd}(t) \rrbracket \rho \triangleq \pi_2^*(\llbracket t \rrbracket \rho)$$

Astrazione

$$D_{\tau_1 \rightarrow \tau_2} \triangleq [D_{\tau_1} \rightarrow D_{\tau_2}]_{\perp}$$

$$\llbracket \lambda x. \, t \rrbracket \rho \triangleq \lfloor \lambda d. \, \llbracket t \rrbracket \rho[d/x] \rfloor$$
$$D_{\tau_1 \rightarrow \tau_2} = [D_{\tau_1} \rightarrow D_{\tau_2}]_{\perp}$$
$$\frac{\frac{\frac{\llbracket \lambda x. \, t \rrbracket \rho}{\tau_1 \rightarrow \tau_2}}{D_{\tau_1}} \, \frac{\frac{\llbracket t \rrbracket \rho}{\tau_2}}{D_{\tau_2}}}{D_{\tau_1} \rightarrow D_{\tau_2}}}{[D_{\tau_1} \rightarrow D_{\tau_2}]_{\perp}}$$

Applicazione (lazy)

Equivalentemente: $\llbracket t \ t_0 \rrbracket \rho \triangleq (\lambda \varphi. \varphi(\llbracket t_0 \rrbracket \rho))^* (\llbracket t \rrbracket \rho)$

$$\llbracket t \ t_0 \rrbracket \rho \triangleq \text{let } \underline{\varphi} \Leftarrow \llbracket t \rrbracket \rho. \underline{\varphi}(\llbracket t_0 \rrbracket \rho)$$

$V_{\tau_0 \rightarrow \tau} = [D_{\tau_0} \rightarrow D_\tau]$ $D_{\tau_0 \rightarrow \tau} = (V_{\tau_0 \rightarrow \tau})_\perp$
 $D_{\tau_0} \rightarrow D_\tau$ D_{τ_0}
 D_τ

Ricorsione

$$\llbracket \mathbf{rec} \ x. \ t \rrbracket \rho \triangleq \llbracket t \rrbracket \rho \llbracket \mathbf{rec} \ x. \ t \rrbracket \rho /_x$$

The diagram illustrates the semantics of a recursive binding. It shows two horizontal bars representing environments. The left bar, labeled D_τ , represents the environment where the variable x is bound to a term t . The right bar, also labeled D_τ , represents the environment where the variable x is bound to a recursive call to the same term t .

Ricorsione

$$\llbracket \mathbf{rec} \ x. \ t \rrbracket \rho \triangleq \text{fix } \lambda d. \ \llbracket t \rrbracket \rho [^d / _x]$$

The diagram illustrates the type derivation for a recursive function. It shows two main components:

- Left Component:** $\llbracket \mathbf{rec} \ x. \ t \rrbracket \rho \triangleq \text{fix } \lambda d. \ \llbracket t \rrbracket \rho [^d / _x]$
This is derived from the type of the body t (which is τ) and the type of the parameter x (also τ). The type of the function abstraction is $\tau \rightarrow D_\tau$.
- Right Component:** $\llbracket D_\tau \rightarrow D_\tau \rrbracket$
This is derived from the type of the function d (which is $[D_\tau \rightarrow D_\tau] \rightarrow D_\tau$) and the type of its argument D_τ .

Recap

$$\llbracket n \rrbracket \rho \triangleq \lfloor n \rfloor$$

$$\llbracket x \rrbracket \rho \triangleq \rho(x)$$

$$\llbracket t_1 \text{ op } t_2 \rrbracket \rho \triangleq \llbracket t_1 \rrbracket \rho \mathop{\underline{\text{op}}}_\perp \llbracket t_2 \rrbracket \rho$$

$$\llbracket \text{if } t \text{ then } t_1 \text{ else } t_2 \rrbracket \rho \triangleq \text{Cond}_\tau(\llbracket t \rrbracket \rho, \llbracket t_1 \rrbracket \rho, \llbracket t_2 \rrbracket \rho)$$

$$\llbracket (t_1, t_2) \rrbracket \rho \triangleq \lfloor (\llbracket t_1 \rrbracket \rho, \llbracket t_2 \rrbracket \rho) \rfloor$$

$$\llbracket \mathbf{fst}(t) \rrbracket \rho \triangleq \pi_1^*(\llbracket t \rrbracket \rho)$$

$$\llbracket \mathbf{snd}(t) \rrbracket \rho \triangleq \pi_2^*(\llbracket t \rrbracket \rho)$$

$$\llbracket \lambda x. t \rrbracket \rho \triangleq \lfloor \lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^{[d/x]} \rfloor$$

$$\llbracket t \; t_0 \rrbracket \rho \triangleq \text{let } \varphi \Leftarrow \llbracket t \rrbracket \rho. \varphi(\llbracket t_0 \rrbracket \rho)$$

$$\llbracket \mathbf{rec} \; x. \; t \rrbracket \rho \triangleq \text{fix } \lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^{[d/x]}$$

Esempi

I seguenti termini hanno la stessa semantica?

$$f \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x : \text{int}. \ 3$$

$$g \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x : \text{int}. \ \mathbf{if} \ x \ \mathbf{then} \ 3 \ \mathbf{else} \ 3$$

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{rec} \ y : \text{int} \rightarrow \text{int}. \ \lambda x : \text{int}. \ 3$$

Esempio

$$f \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x : \text{int}. \ 3$$

$$\llbracket \lambda x. \ t \rrbracket \rho \triangleq \lfloor \lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^{[d/x]} \rfloor \quad \quad \llbracket n \rrbracket \rho \triangleq \lfloor n \rfloor$$

$$\llbracket f \rrbracket \rho = \llbracket \lambda x. \ 3 \rrbracket \rho = \lfloor \lambda d. \llbracket 3 \rrbracket \rho^{[d/x]} \rfloor = \lfloor \lambda d. \lfloor 3 \rfloor \rfloor$$

Esempio

$$g \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x : \text{int}. \text{ if } x \text{ then } 3 \text{ else } 3$$

$$\llbracket \lambda x. t \rrbracket \rho \triangleq \lfloor \lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^d /_x \rfloor$$

$$\begin{aligned}\llbracket g \rrbracket \rho &= \llbracket \lambda x. \text{ if } x \text{ then } 3 \text{ else } 3 \rrbracket \rho \\&= \lfloor \lambda d. \llbracket \text{if } x \text{ then } 3 \text{ else } 3 \rrbracket \rho^d /_x \rfloor \\&\quad \llbracket \text{if } t \text{ then } t_1 \text{ else } t_2 \rrbracket \rho \triangleq \text{Cond}_\tau(\llbracket t \rrbracket \rho, \llbracket t_1 \rrbracket \rho, \llbracket t_2 \rrbracket \rho) \\&= \lfloor \lambda d. \text{Cond}(d, \lfloor 3 \rfloor, \lfloor 3 \rfloor) \rfloor \\&\quad \text{Cond}_\tau(v, d_1, d_2) \triangleq \begin{cases} \perp_{D_\tau} & \text{se } v = \perp_{\mathbb{Z}_\perp} \\ d_1 & \text{se } v = [0] \\ d_2 & \text{altrimenti } (v = [n] \text{ con } n \neq 0) \end{cases} \\&= \lfloor \lambda d. \text{let } x \Leftarrow d. \lfloor 3 \rfloor \rfloor\end{aligned}$$

$$\llbracket f \rrbracket \rho \neq \llbracket g \rrbracket \rho$$

$$\lfloor \lambda d. \lfloor 3 \rfloor \rfloor \quad f \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x : \text{int}. 3$$

Esempio

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{rec} \ y : int \rightarrow int. \ \lambda x : int. \ 3$$

$$\begin{aligned} \llbracket h \rrbracket \rho &= \llbracket \mathbf{rec} \ y. \ \lambda x. \ 3 \rrbracket \rho & \llbracket \mathbf{rec} \ x. \ t \rrbracket \rho \triangleq \text{fix } \lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^{[d/x]} \\ &= \text{fix } \lambda d_y. \llbracket \lambda x. \ 3 \rrbracket \rho^{[d_y/y]} \quad \llbracket \lambda x. \ t \rrbracket \rho \triangleq \lfloor \lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^{[d/x]} \rfloor \\ &= \text{fix } \lambda d_y. \lfloor \lambda d_x. \llbracket 3 \rrbracket \rho^{[d_y/y, d_x/x]} \rfloor \\ &= \text{fix } \lambda d_y. \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor & \Gamma_h = \lambda d_y. \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor \end{aligned}$$

$$d_0 = \Gamma_h^0(\perp_{[\mathbb{Z}_\perp \rightarrow \mathbb{Z}_\perp]_\perp}) = \perp_{[\mathbb{Z}_\perp \rightarrow \mathbb{Z}_\perp]_\perp}$$

$$d_1 = \Gamma_h(d_0) = (\lambda d_y. \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor) \perp = \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor$$

$$d_2 = \Gamma_h(d_1) = (\lambda d_y. \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor) \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor = \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor = d_1$$

Esempio

$h \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{rec} y : \text{int} \rightarrow \text{int}. \lambda x : \text{int}. 3$

$$\Gamma_h = \lambda d_y. \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor$$

$$d_0 = \Gamma_h^0(\perp_{[\mathbb{Z}_\perp \rightarrow \mathbb{Z}_\perp]_\perp}) = \perp_{[\mathbb{Z}_\perp \rightarrow \mathbb{Z}_\perp]_\perp}$$

$$d_1 = \Gamma_h(d_0) = (\lambda d_y. \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor) \perp = \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor$$

Elemento massimale in $[\mathbb{Z}_\perp \rightarrow \mathbb{Z}_\perp]_\perp$
potremmo già fermarci

Esempio

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{rec} y : \textit{int} \rightarrow \textit{int}. \lambda x : \textit{int}. 3$$

$$\llbracket h \rrbracket \rho = \lfloor \lambda d_x. \lfloor 3 \rfloor \rfloor = \llbracket f \rrbracket \rho$$

$$\llbracket f \rrbracket \rho = \llbracket \lambda x. 3 \rrbracket \rho = \lfloor \lambda d. \llbracket 3 \rrbracket \rho^d /_x \rfloor = \lfloor \lambda d. \lfloor 3 \rfloor \rfloor$$

$$f \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x : \textit{int}. 3$$

Esempio

$$x : \tau \quad \llbracket \mathbf{rec} \ x. \ t \rrbracket \rho \triangleq \text{fix } \lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^{[d/x]}$$

$$\begin{aligned} \llbracket \mathbf{rec} \ x. \ x \rrbracket \rho &= \text{fix } \lambda d_x. \llbracket x \rrbracket \rho^{[d_x/x]} \\ &= \text{fix } \lambda d_x. \ d_x \end{aligned}$$

$$d_0 = \perp_{D_\tau}$$

$$d_1 = (\lambda d_x. d_x) \ d_0 = d_0 = \perp_{D_\tau}$$

$$\llbracket \mathbf{rec} \ x. \ x \rrbracket \rho = \perp_{D_\tau}$$

$$x : \mathit{int} \rightarrow \mathit{int} \quad \llbracket \mathbf{rec} \ x. \ x \rrbracket \rho = \perp_{[\mathbb{Z}_\perp \rightarrow \mathbb{Z}_\perp]_\perp}$$

$$x : \mathit{int} * \mathit{int} \quad \llbracket \mathbf{rec} \ x. \ x \rrbracket \rho = \perp_{(\mathbb{Z}_\perp \times \mathbb{Z}_\perp)_\perp}$$

Esempi

I seguenti termini hanno la stessa semantica?

rec $x.$ x

$\lambda y.$ **rec** $z.$ z

Esempio

$$\begin{array}{ll} y : \tau_1 & z : \tau_2 \\ \llbracket \lambda x. t \rrbracket \rho \triangleq \lfloor \lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^{[d/x]} \rfloor \\ \llbracket \lambda y. \mathbf{rec}~z. z \rrbracket \rho = \lfloor \lambda d_y. \llbracket \mathbf{rec}~z. z \rrbracket \rho^{[d_y/y]} \rfloor \\ = \lfloor \lambda d_y. \perp_{D_{\tau_2}} \rfloor \\ = \lfloor \perp_{[D_{\tau_1} \rightarrow D_{\tau_2}]} \rfloor \\ = \lfloor \perp_{V_{\tau_1 \rightarrow \tau_2}} \rfloor \\ \neq \perp_{D_{\tau_1 \rightarrow \tau_2}} = \perp_{(V_{\tau_1 \rightarrow \tau_2})_{\perp}} \end{array}$$

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $x : int \rightarrow int$ | $\llbracket \mathbf{rec}~x. x \rrbracket \rho = \perp_{[\mathbb{Z}_{\perp} \rightarrow \mathbb{Z}_{\perp}]_{\perp}}$ | diverge |
| $y : int, z : int$ | $\llbracket \lambda y. \mathbf{rec}~z. z \rrbracket \rho = \lfloor \perp_{[\mathbb{Z}_{\perp} \rightarrow \mathbb{Z}_{\perp}]} \rfloor$ | aspetta arg e diverge |

Esercizio

$x : int * int , y : int , z : int$

$$\llbracket \text{rec } x. \ x \rrbracket \rho \stackrel{?}{=} \llbracket (\text{rec } y. \ y , \text{rec } z. \ z) \rrbracket \rho$$



diverge una coppia
 di computazioni divergenti

$\perp_{D_{int*int}}$

$\lfloor (\perp_{D_{int}}, \perp_{D_{int}}) \rfloor$

Lazy vs Eager

Applicazioni Eager

returns \perp quando $\llbracket t \rrbracket \rho = \perp$

lazy $\llbracket t \; t_0 \rrbracket \rho \triangleq \text{let } \varphi \Leftarrow \llbracket t \rrbracket \rho. \; \varphi(\llbracket t_0 \rrbracket \rho)$

eager $\llbracket t \; t_0 \rrbracket \rho \triangleq \text{let } \varphi \Leftarrow \llbracket t \rrbracket \rho. \; \text{let } d \Leftarrow \llbracket t_0 \rrbracket \rho. \; \varphi([d])$

returns \perp quando $\llbracket t \rrbracket \rho = \perp$ o $\llbracket t_0 \rrbracket \rho = \perp$

Definizioni ben costruite

Ben definite

Dobbiamo garantire che tutte le funzioni che abbiamo usato siano monotone e continue,
in modo che la teoria dei punti fissi di Kleene sia applicabile

$\pi_1 \ \pi_2 \ (\cdot)^*$ apply fix let già analizzate

op_⊥ Cond_τ λ da controllare

TH. $\underline{\text{op}}_{\perp}$ e' monotono e continuo

$$\underline{\text{op}}_{\perp} : \mathbb{Z}_{\perp} \times \mathbb{Z}_{\perp} \rightarrow \mathbb{Z}_{\perp}$$

$$v_1 \underline{\text{op}}_{\perp} v_2 \triangleq \begin{cases} \lfloor n_1 \underline{\text{op}} n_2 \rfloor & \text{se } v_1 = \lfloor n_1 \rfloor \text{ e } v_2 = \lfloor n_2 \rfloor \\ \perp_{\mathbb{Z}_{\perp}} & \text{altrimenti } (v_1 = \perp_{\mathbb{Z}_{\perp}} \text{ o } v_2 = \perp_{\mathbb{Z}_{\perp}}) \end{cases}$$

Omettiamo il controllo di monotonicita'

Dal momento che il dominio ha solo catene finite, e' anche continuo

TH. Cond_τ e' monotona e continua

$\text{Cond}_\tau : \mathbb{Z}_\perp \times D_\tau \times D_\tau \rightarrow D_\tau$

$$\text{Cond}_\tau(v, d_1, d_2) \triangleq \begin{cases} \perp_{D_\tau} & \text{se } v = \perp_{\mathbb{Z}_\perp} \\ d_1 & \text{se } v = [0] \\ d_2 & \text{altrimenti } (v = [n] \text{ con } n \neq 0) \end{cases}$$

Omettiamo il controllo di monotonicità

Dimostriamo la continuità su ogni parametro separatamente

Il primo parametro e' in \mathbb{Z}_\perp

sono possibili solo catene finite, quindi la continuità è garantita

Dimostriamo la continuità sul secondo parametro

Per il terzo parametro la prova è analoga e viene omessa

(continua)

$$\text{Cond}_\tau : \mathbb{Z}_\perp \times D_\tau \times D_\tau \rightarrow D_\tau$$


$$\text{Cond}_\tau(v, d_1, d_2) \triangleq \begin{cases} \perp_{D_\tau} & \text{se } v = \perp_{\mathbb{Z}_\perp} \\ d_1 & \text{se } v = [0] \\ d_2 & \text{altrimenti } (v = [n] \text{ con } n \neq 0) \end{cases}$$

Continuità sul secondo parametro

prendiamo $v \in \mathbb{Z}_\perp, d \in D_\tau, \{d_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq D_\tau$

vogliamo provare $\text{Cond}_\tau \left(v, \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} d_i, d \right) = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} \text{Cond}_\tau(v, d_i, d)$

procediamo per analisi dei casi



(continua)

$$\text{Cond}_\tau : \mathbb{Z}_\perp \times D_\tau \times D_\tau \rightarrow D_\tau$$

$$\text{Cond}_\tau(v, d_1, d_2) \triangleq \begin{cases} \perp_{D_\tau} & \text{se } v = \perp_{\mathbb{Z}_\perp} \\ d_1 & \text{se } v = \lfloor 0 \rfloor \\ d_2 & \text{altrimenti } (v = \lfloor n \rfloor \text{ con } n \neq 0) \end{cases}$$

$$v = \perp_{\mathbb{Z}_\perp}$$

$$\text{Cond}_\tau \left(\perp_{\mathbb{Z}_\perp}, \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} d_i, d \right) = \perp_{D_\tau} = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} \perp_{D_\tau} = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} \text{Cond}_\tau(\perp_{\mathbb{Z}_\perp}, d_i, d)$$

(continua)

$$\text{Cond}_\tau : \mathbb{Z}_\perp \times D_\tau \times D_\tau \rightarrow D_\tau$$

$$\text{Cond}_\tau(v, d_1, d_2) \triangleq \begin{cases} \perp_{D_\tau} & \text{se } v = \perp_{\mathbb{Z}_\perp} \\ d_1 & \text{se } v = \lfloor 0 \rfloor \\ d_2 & \text{altrimenti (} v = \lfloor n \rfloor \text{ con } n \neq 0 \text{)} \end{cases}$$

$$v = \lfloor 0 \rfloor$$

$$\text{Cond}_\tau \left(\lfloor 0 \rfloor, \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} d_i, d \right) = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} d_i = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} \text{Cond}_\tau(\lfloor 0 \rfloor, d_i, d)$$

(continua)

$$\text{Cond}_\tau : \mathbb{Z}_\perp \times D_\tau \times D_\tau \rightarrow D_\tau$$

$$\text{Cond}_\tau(v, d_1, d_2) \triangleq \begin{cases} \perp_{D_\tau} & \text{se } v = \perp_{\mathbb{Z}_\perp} \\ d_1 & \text{se } v = \lfloor 0 \rfloor \\ d_2 & \text{altrimenti } (v = \lfloor n \rfloor \text{ con } n \neq 0) \end{cases}$$

$$v = \lfloor n \rfloor, \quad n \neq 0$$

$$\text{Cond}_\tau \left(\lfloor n \rfloor, \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} d_i, d \right) = d = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} d = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} \text{Cond}_\tau(\lfloor n \rfloor, d_i, d)$$

TH. la lambda astrazione e' monotona e continua

$t : \tau$

$\lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^{[d/x]}$ e' continua

ci concentriamo su una proprietà più forte

\tilde{x} ennupla x_1, \dots, x_n \tilde{d} ennupla d_1, \dots, d_n

$\lambda \tilde{d}. \llbracket t \rrbracket \rho^{[\tilde{d}/\tilde{x}]}$ e' continua

la prova e' per induzione strutturale su t

(provateci)

Corollary $t : \tau_0 \rightarrow \tau$ fix $\lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho^{[d/x]}$ e' continua

(il limite di funzioni continue è continuo)

Proprieta' principali

Lemma di sostituzione

$x, t_0 : \tau_0$
 $t : \tau$

$\llbracket t[t_0/x] \rrbracket \rho = \llbracket t \rrbracket \rho[\llbracket t_0 \rrbracket \rho / x]$

sostituzione sintattica

update dell'ambiente

la prova e' per induzione strutturale su t
(provateci)

Composizionalità'

Il lemma di sostituzione $\llbracket t^{[t_0/x]} \rrbracket \rho = \llbracket t \rrbracket \rho^{[\llbracket t_0 \rrbracket \rho/x]}$ è importante perché garantisce la composizionalità della semantica denotazionale

TH. $\llbracket t_1 \rrbracket \rho = \llbracket t_2 \rrbracket \rho \quad \Rightarrow \quad \llbracket t^{[t_1/x]} \rrbracket \rho = \llbracket t^{[t_2/x]} \rrbracket \rho$

proof. assumiamo $\llbracket t_1 \rrbracket \rho = \llbracket t_2 \rrbracket \rho$

Solo le variabili free hanno importanza

TH. $t : \tau$

$$\forall x \in \text{fv}(t). \rho(x) = \rho'(x) \quad \Rightarrow \quad \llbracket t \rrbracket \rho = \llbracket t \rrbracket \rho'$$

la prova e' per induzione strutturale su t

(provateci)

Corollary t chiuso $\Rightarrow \forall \rho, \rho'. \llbracket t \rrbracket \rho = \llbracket t \rrbracket \rho'$

TH. I termini canonici non sono bottom

$$c \in C_\tau \Rightarrow \forall \rho. \llbracket c \rrbracket \rho \neq \perp_{D_\tau}$$

prova. per induzione sulle regole dei termini canonici

$$P(c \in C_\tau) \triangleq \forall \rho. \llbracket c \rrbracket \rho \neq \perp_{D_\tau}$$

$$\overline{n \in C_{int}}$$

$$\llbracket n \rrbracket \rho = \lfloor n \rfloor \neq \perp_{D_{int}}$$

$$\frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ closed}}{(t_0, t_1) \in C_{\tau_0 * \tau_1}}$$

$$\llbracket (t_0, t_1) \rrbracket \rho = \lfloor (\llbracket t_0 \rrbracket \rho, \llbracket t_1 \rrbracket \rho) \rfloor \neq \perp_{D_{\tau_0 * \tau_1}}$$

$$\frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \lambda x. t \text{ closed}}{\lambda x. t \in C_{\tau_0 \rightarrow \tau_1}}$$

$$\llbracket \lambda x. t \rrbracket \rho = \lfloor \lambda d. \llbracket t \rrbracket \rho[d/x] \rfloor \neq \perp_{D_{\tau_0 \rightarrow \tau_1}}$$